

フィラジルをお使いになる患者さんへ

このHAEの発作(腫れ)も (遺伝性血管性浮腫) 先生に相談^(治療)して良いの？



監修：
埼玉草加病院
本田 大介 先生

このようなHAEの発作(腫れ)を
我慢していませんか？



手の発作



足の発作



おなかの発作



時々あります…。



発作の部位がどこであっても、
我慢しなくても大丈夫です。
その理由を見てみましょう。

裏面へ

※のどの発作の場合、まず注射をしてから主治医に連絡のうえ必ず来院してください。



武田薬品工業株式会社

なぜ発作(腫れ)を我慢しなくて良いのか？

その理由を見てみましょう。

すべての発作は生活に影響をおよぼすことがあるため、どの部位の発作でも早期治療をすることが重要です。



お仕事・勉強



料理



運動



子育て



車の運転



HAE発作の重症化予防と早期回復のためにも
早期治療をしましょう。

国内外のHAE診療ガイドラインにおいても、
発作(腫れ)の部位によらず、早期治療が重要
であると記載されています。※1 ※2

※1:世界アレルギー機構、欧州アレルギー・臨床免疫学会「遺伝性血管性浮腫治療のためのWAO/EAACI国際ガイドライン-2017年改訂・更新版」

※2:日本補体学会「遺伝性血管性浮腫 診療ガイドライン 改訂2019年版」

フィラジルは自己注射が可能のため、
発作が起こったその場で治療ができます。

- 十分な練習を行ったのち、医師の判断により自己注射が可能となります。
- のどの発作の場合、まず注射をしてから主治医に連絡のうえ必ず来院してください。
- お薬のことや、治療のタイミングのことでわからないことがあった場合には、主治医にご相談ください。



自己投与
可能



突発的な
発作に
対応可能



携帯
可能



2～25℃
で保存



発作の発生と治療タイミングを記録して先生と共有しましょう

スマートフォンアプリ
「HAEノート」



運営会社
株式会社 Welby
welby

もっとHAEについて知る

遺伝性血管性浮腫(HAE)の情報サイト

腫れ・腹痛ナビ

腫れ・腹痛ナビ 🔍

<https://www.harefukutsuu-hae.jp/>



●「HAEノート」のご利用に際し、会員登録は不要です。どなたでも簡単にご利用頂けます。※入力した情報はご自身のスマートフォン内のみに保存されます。

医療機関名