


## HAEの発作(腫れ)を治療するタイミングは (遺伝性血管性浮腫)

# いつが良いの？

監修：埼友草加病院  
大澤 純 先生



HAEの発作は早く治療すれば  
腫れや痛みがひどくならず  
**早く治まることが  
わかっているんですよ。**

※発作によっては複数回の治療が必要な場合もあります。詳しくは主治医にお聞きください。

なぜ早く治療をすると早く発作が治まるのか?  
その理由を見てみましょう。

裏面へ




武田薬品工業株式会社

# なぜ早く治療をすると早く発作が治まるのか? その理由を見てみましょう。

## ↙ 発作の原因は、血管からの水漏れだからです ↘

### 普段の状態



血管は正常に動き、  
血液も正常に流れています。

### 発作が起きた時



血管の壁にすきまができ、血管の中の水分\*が  
皮膚の下に漏れ出して腫れや痛みがおこります。

\*血液の成分

お薬には、水漏れを止めて腫れが  
それ以上ひどくならないようする効果はありますが、  
いちど漏れ出した水分をもとに戻す効果はありません。  
そのため、進んでしまった腫れが戻るには  
時間がかかるのです。\*

※漏れ出した水分は自身の身体のちからで時間をかけて自然に戻っていきます。



だから血管からの水漏れが進んで腫れが  
ひどくなる前に、我慢せずにできるだけ早く  
お薬で止めることが大事なんですよ。

フィラジルは自己注射が可能なため、  
発作が起こったその場で治療ができます。

- 十分な練習を行ったのち、医師の判断により自己注射が可能となります。
- のどの発作の場合、まず注射をしてから主治医に連絡のうえ必ず来院してください。
- お薬のことや、治療のタイミングのことでわからないことがあった場合には、主治医にご相談ください。



発作の発生と治療タイミングを記録して先生と共有しましょう

スマートフォンアプリ  
**「HAEノート」**



運営会社  
株式会社 Welby  
welby

もっとHAEについて知る

遺伝性血管性浮腫(HAE)の情報サイト  
**腫れ・腹痛ナビ** 腫れ・腹痛ナビ  
<https://www.harefukutsuu-hae.jp/>



●「HAEノート」のご利用に際し、会員登録は不要です。どなたでも簡単にご利用頂けます。※入力した情報はご自身のスマートフォン内のみに保存されます。

医療機関名